

Patsiendi nõusolek gastroskopia teostamiseks

Lugupeetud patsient!

Teie tervise täpsemaks uurimiseks palume Teie nõusolekut gastroskopia läbiviimiseks.

Üldinfo

Gastroskopia on seedetrakti ülaosa uuring, mille käigus saab arst ülevaate söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiksoole seisukorrast. Gastroskopia käigus viiakse suu kaudu makku elastne instrument – gastrokoop. Uuring kestab umbes 10 minutit, uuring võib pikeneda biopsia võtmise või raviprotseduuride teostamise korral.

Uuring võimaldab

- selgitada Teie kaebuste põhjusi (ülakõhuvalu, iiveldus, oksendamine, neelamishäired);
- leida haiguslikke muutusi söögitorus, maos või kaksteistsõrmiksooles (verejooks, haavand, kasvaja);
- võtta proovitükke (biopsia) diagnoosi täpsustamiseks.

Uuringuks ettevalmistus

- Vähemalt 12 tundi enne uuringut ei tohi süüa ega juua;
- Enne uuringut võtke ära prillid ja hambaproteesid;
- Teavitage arsti enne uuringut, kui tarvitate verd vedeldavaid ravimeid;
- Raviprotseduuride teostamisel on soovitatav tulla uuringule saatjaga, kes hoolitseb Teie turvalise kojutõstmise eest pärast uuringut.

Uuringu teostamine

- Teile võidakse pakkuda kohalikku anesteetikumi ehk valuvaigistit, mis muudab suu ja kurgu tuimaks, enne seda täpsustatakse allergia olemasolu.
- Uuringu ajal lamate vasakul küljel, püüdke rahulikult lamada ja maksimaalselt lõdvestuda.
- Endoskoobi kaitseks paigaldatakse hammaste/igemete vahele plasthuulik.
- Uuring ei ole valulik, kuid on ebameeldiv tekkiva okse- ja kõharefleksi tõttu.
- Suhu tekkivat sülg ei tohiks üritada alla neelata, vaid lasta sellel välja voolata.
- Endoskoobi abil viiakse makku õhku, et magu venituks ja limaskest oleks arstile nähtav. Õhk maos tekitab täiskõhu tunde, uuringu järgselt võib sisse viidud õhk suu kaudu väljuda.

Uuringu järgselt

- Peale kohalikku tuimestit ei tohi Te süüa ega juua umbes 30 minutit.
- Biopsiate võtmise järgselt vältige kuumade söökide ja jookide tarbimist kuna tekib veritsuse oht;
- Kui raviprotseduuri ajal manustati Teile rahustit, ei tohi Te samal päeval autot juhtida, sest ravim vähendab reaktsioonikiirust.

Tüsistused

- Gastroskoopial tekivad tüsistused harva. Esineda võib verejooks proovitükkide võtmise järgselt.
- Samuti võib esineda söögitoru või mao seina perforatsioon ehk mulgustus – esineb harva, kuid vajab kirurgilist ravi.
- Kui Teil tekib peale uuringut palavik, tugev kõhuvalu või verejooks, pöörduge koheselt raviarsti poole või erakorralise meditsiini osakonda.

Käesolevaga kinnitan, et olen seda dokumenti lugenud ja selle sisust täielikult aru saanud. Olen teadlik uuringu põhiolomusest ja võimalikest ohtudest.

Olen enne oma nõusoleku andmist saanud mind rahuldavad vastused oma küsimustele selle uuringuga kaasnevate ohtude ning tüsistuste kohta.

Kui Te ei saa määratud ajal uuringule tulla, siis teavitage sellest esimesel võimalusel oma raviarsti.

(patsiendi või tema esindaja nimi ja allkiri)

(kuupäev, kellaaeg)