

Patsiendi nõusolek/infoleht gastroskopia teostamiseks

Lugupeetud patsient!

Gastroskopia on seedetrakti ülaosa uuring, mis on vajalik Teie tervise täpsemaks uurimiseks. Siinse infolehega palume Teie nõusolekut gastroskopia läbiviimiseks.

Üldinfo

Gastroskopia käigus saab arst ülevaate söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiksoole seisukorrast. Uuringu käigus viiakse suu kaudu makku elastne instrument – gastrokoop ja nähtavuse parandamiseks õhku. Uuring kestab harilikult 5-10 minutit. Gastroskopia kestus pikeneb juhul, kui selle käigus võetakse proovitükke või viiakse läbi raviprotseduur.

Uuringu näidustused

Gastroskopia võimaldab:

- selgitada Teie kaebuste põhjusi (ülakõhuvalu, iiveldus, oksendamine, neelamishäired ja teised);
- leida haiguslikke muutusi söögitorus, maos või kaksteistsõrmiksooles (verejooks, haavand, kasvajad ja teised);
- võtta proovitükke (biopsia) diagnoosi täpsustamiseks.

Enne uuringut

- Kuus tundi enne uuringut ei tohi süüa ja juua teed või kohvi;
- Vett võib juua väikeses koguses kuni 2 tundi enne uuringut;
- Kasutatavad vererõhuravimid võtke hommikul skeemi järgi, aga vähese veega;
- Kui tarvitate verd vedeldavaid ravimeid, palun andke teada sellest oma raviarstile, vajaduse korral tuleb raviskeemi ajutiselt muuta;
- Kui Teile tehakse gastroskopia käigus raviprotseduure, siis on soovitatav tulla uuringule saatjaga, kes hoolitseb Teie turvalise kojutõudmise eest pärast uuringut.

Uuringu käik

- Uuringu ajal palume Teil heita uuringuvoodile vasakule küljele pikali, rahulikult lamada ja maksimaalselt lõdvestuda;
- Kui Teil on väljavõetavad hambaproteesid, siis palume Teil need enne uuringut suust eemaldada, et vältida proteeside sattumist hingamisteedesse;
- Kui Teil on suu- ja huulepiirkonnas ehted, siis palume need enne uuringut eemaldada;
- Teile võidakse pakkuda kohalikku anesteetikumi ehk tuimestust, mis muudab suu ja kurgu tuimaks, enne seda täpsustatakse allergia olemasolu;
- Teie hammaste/igemete vahele asetatakse plasthuulik, et kaitsta gastroskopi ja vältida selle purunemist hammustuse tõttu;
- Uuring ei ole valulik, kuid on ebameeldiv tekkiva okse- ja kõharefleksi tõttu;
- Uuringuks makku viidud õhk tekitab täiskõhutunde;
- Suhu tekkivat sülge ei tohiks üritada alla neelata, vaid lasta sellel välja voolata.

Pärast uuringut

- Uuringu järel võib süüa ja juua kohe, kuid soovitatavalt jahedamat toitu ning jooki, et vältida veritsemise ohtu;
- Juhul, kui uuringu läbiviimisel oli neel tuimastatud, ei tohi pärast uuringut süüa ega juua ühe tunni jooksul

Uuringuga seotud riskid

Harilikult talutakse gastroskoopiat hästi ja tüsistusi esineb harva, kuid:

- Võib tekkida allergia tuimastuseks kasutatavale ravimile;
- Väga harvadel juhtudel võib raviprotseduuri käigus proovitüki võtmisel tekkida verejooksu oht;
- Võib tekkida söögitoru või mao seina perforatsioon ehk mulgustus – esineb harva ja vajab kirurgilist ravi;
- Kui Teil tekib peale uuringut palavik, tugev kõhuvalu või verejooks, pöörduge koheselt raviarsti poole või erakorralise meditsiini osakonda.

Käesolevaga kinnitan, et olen seda dokumenti lugenud ja selle sisust täielikult aru saanud. Olen teadlik uuringu põhiolemusest ja võimalikest ohtudest.

Olen enne oma nõusoleku andmist saanud mind rahuldavad vastused oma küsimustele selle uuringuga kaasnevate ohtude ning tüsistuste kohta.

Kui ma ei saa määratud ajal uuringule tulla, siis teavitan sellest esimesel võimalusel oma raviarsti.

(patsiendi või tema esindaja nimi ja allkiri)

(kuupäev, kellaaeg)