

Информационный лист для пациента, которому предстоит операция

Цель данного информационного листа – предоставить пациенту необходимую информацию, связанную с предстоящей операцией.

Дата и время операции: _____

Просим Вас прибыть в регистратуру Aurora Clinic (ул. Sepise 7, здание Alma Tominga, 1-й этаж) за один (1) час до назначенного времени.



В регистратуре Вас оформят в клинику и затем направят в зону ожидания или в палату.

Если у Вас нет возможности прибыть в клинику в согласованное время (например, из-за заболевания), просим сообщить об этом как можно скорее:

- +372 605 0610 (в рабочие дни 8:00–17:30) или
- kesk.registratuur@medicum.ee либо karina.tint@medicum.ee (вне рабочего времени)

В течение недели перед операцией и в день операции пациент не должен быть остро больным (насморк, кашель, повышенная температура).

Регулярно принимаемые лекарства

Заранее сообщите своему лечащему врачу или медсестре обо всех лекарствах, которые Вы принимаете.

Обязательно уведомьте медицинский персонал, если Вы принимаете препараты, разжижающие кровь (например: Аспирин, Мареван, Эликвис, Ксарелто, Прадакса, Ликсиана) или инсулин, чтобы при необходимости скорректировать схему их приема и своевременно отменить перед операцией.

Другие регулярно принимаемые лекарства следует принять утром в день операции, запивая их небольшим количеством воды.

Возьмите с собой в клинику:

- удостоверение личности (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение);
- регулярно принимаемые лекарства;
- личные предметы гигиены;
- тапочки;
- необходимые вспомогательные средства (костыли, трость, очки, слуховой аппарат и др.).

Перед операцией

При операции под общим наркозом нельзя есть в течение 6 часов до операции, пить – в течение 4 часов, жевать жевательную резинку или курить.

Если Вы ели или пили перед операцией, в интересах Вашей безопасности операция будет отложена.

После операции

После операции в рамках дневного стационара Вам предложат йогурт, смузи и чай. В течение 24 часов после анестезии (даже кратковременной) из-за возможных нарушений реакции запрещается водить автомобиль и работать с механизмами. Для безопасного возвращения домой при необходимости пригласите сопровождающего или заранее организуйте транспорт.